

Védekezés II.



Dr. Czimmer Gyula

Legutóbb a kutyák vakcinázásának általános elveit próbáltam elmondani, de nézzük inkább, mi használható ebből az életben!

Beszéltünk arról, hogy túl korán sem szabad elkezdni az oltásokat (nem a reggel öt körüli időpontra gondolok, hanem a kölyök életkorára), de ne is várjunk túl sokáig a vakcinázással, mert ha az anyai ellenanyagok teljesen kiürülnek, akkor lyuk t á m a d h a t a

a védekezőrendszeren. A rottweilerek és a dobermanok

esetében évekkel ezelőtt még jellemző volt a parvovírussal szembeni fokozott érzékenység, ezért sokan- biztos, ami biztos-, még ma is korábban és többször vakcinázzák ezeket az állatokat. Fontos, hogy a kölyök a vakcinázáskor egészséges legyen, jól működő, válaszképes immunrendszerrel, ezért célszerű előtte például féreghajtót is adni.



A biztonságosnak tekintett védettséghez a kölyök vakcinázását a legtöbb esetben háromszor meg kell ismételni

“JÓSZÍV” ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükről még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelően.

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS:
Anubisz Temetkezési Kft.
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Tel.: 96/211-277

3-4 hetes időközzel, az utolsót min. 14-16 hetes korban.

Jó, de akkor mégis mikor vakcinázzunk először?

Végezhetnénk drága tesztekkel az anyától kapott ellenanyagok szintjének ellenőrzésére, de még az is kevésbé költséges, ha egy esetleg túl korai (és ezért feleslegesnek tűnő) vakcinázást is beiktatunk az oltási sorba legfeljebb kicsit túlbiztosítunk. Ennek túlnyomórészt csak egy hátránya lehet, hogy a tulajdonos idő előtt megunja a sok vakcinázást. A vakcinázási sort általában monovalens (egy betegség ellen védő) élő, gyengített vírust (parvo) tartalmazó vakcinával kezdjük 6-8, de legkésőbb 10 hetes korban. A vakcinázást normál esetben polivalens (más betegségek ellen is védő) oltóanyaggal ismételjük 3-4 hetes időközzel min. kétszer. Itt két lehetséges változatot mutatunk be:

| Milyen betegség ellen: | A kölyök kora az oltáskor (hét) | |
|--|---------------------------------|----|
| Parvovírus; parvovírus és szopornyica | 6 | 8 |
| Parvovírus, szopornyica, CAV-2, parainfluenza-2, | 10 | 12 |
| Parvovírus, szopornyica, CAV-2, parainfluenza-2, | 14 | 16 |

Leptospirozis ellen legkorábban 12 hetes korban ajánlják az első oltást, a másodikat 2-4 héttel később, kockázatnak kitett ebeknél sajnos félévente újraoltás javasolt.

Kennelkőhögés elleni az orr nyálkahártyájára cseppenthető vakcina is forgalomban van, 3 hetes kortól alkalmazható 2-4 hetes időközzel ismételve. A kullancsok által közvetített Lyme-kór ellen (van már a közép-európai törzseknek megfelelő vakcina is) először 9-12 hetes korban vakcinázhatunk, majd 2-4 hét múlva ismétlünk. Apropos, a sokak által kért „kullancs elleni vakcina” nem létezik, hiszen nem a kullancs a betegség, viszont minden, általa közvetített betegség ellen még nincs oltóanyag.

A felnőtt kutyákat általában évente oltjuk újra, kivéve, ha „új” betegség ellen vakcinázzunk. Ilyenkor 2-4 hetes időközzel ismétlünk az első évben (alapimmunizálás). Az újabban kifejlesztett vakcinák esetében az alapimmunizálást követően már hosszabb újraoltási periódusokat (2-3 év) is ajánlanak.

Nem hallgatható el az sem, hogy a vakcináknak lehetnek mellékhatásai (csalánkiütés, duzzanatok, láz, hányás, hasmenés, immun-mediált hemolízis, anaphylaxia stb.) ezek azonban kisebb kockázatot jelentenek a várható hasznukhoz képest.

Remélem sikerült mindenkit jól összezavarni, de nem adom fel. Esetleg forduljanak további információért állatorvosukhoz! Legközelebb jöhetnek a macskák?

Dr. Czimmer Gyula

A Mosonmagyaróvári Civil Tükör havilap
HIRDETÉSSZERVEZŐT keres.
Az érdeklődők jelentkezését a
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 13. sz. alatt,
ill. a 96/566-468-as vagy a 06-20/32-66-690-es
telefonszámokon várjuk!
Újságunk a www.mosonmagyarovar.hu
(gyorslink - helyi újságok) oldalon is olvasható ill. letölthető.